

## Міжнародний рік санітарії — факти про санітарію

- ❖ Кількість населення, що було не забезпечене послугами покращеної санітарії у 2004 році — **2,6 мільярдів** (*PFC5*)
- ❖ Кількість населення, яке отримало доступ до покращеної санітарії у 1990—2004 роках — **1,2 мільярди** (*JMP 06*)
- ❖ Очікувана кількість населення світу у 2015 році — **7,2 мільярди** (*WHO/UNICEF 05 Вода для життя*)
- ❖ Кількість населення, яке залишиться не забезпеченим покращеною санітарією у 2015 році, якщо будуть досягнуті Цілі розвитку тисячоліття (ЦРТ) — **1,8 мільярдів** (*JMP 06*)
- ❖ Кількість населення, що потребує покращання доступу до санітарії протягом десятиліття до 2015 року для досягнення ЦРТ (з урахуванням приросту населення) — **1,6 мільярдів** (*JMP 06*)
- ❖ Кількість населення, що не буде забезпечена покращеною санітарією, якщо нинішні тенденції впровадження ЦРТ у світі продовжаться — **564 мільйони** (*WHO Hutton et al 2007*)
- ❖ Частка населення незабезпечена базовими умовами санітарії (туалетами) у 2004 — **двоє з п'яти** (*PFC5*)
- ❖ Діти до 18 років, що не мають покращених умов санітарії — **980 мільйонів, 280 мільйонів серед них — діти віком до п'яти років** (*UNICEF 2006*)
- ❖ Доступ до санітарії шляхом каналізації: **Латинська Америка та Карибський регіон: 66%, Азія: 18%, Африка: 13%** (*World Health Report, WHO 2004*)
- ❖ Кількість дітей, що помирали кожний день від діарейних захворювань у 2004 році — **5000** (*PFC 5*)
- ❖ Кількість шкільних днів, які не будуть втрачені, якщо будуть досягнені ЦРТ з санітарії (у порівнянні з рівнем на 2000 р.) — **194 мільйони шкільних днів** (*Hutton and Haller, WHO 2004*)
- ❖ Кількість смертей дітей віком до 5 років від діарейних захворювань на рік — **1,5 мільйони** (*PFC 5*)
- ❖ Відсоток смертей від діареї, що пов'язана з водою та умовами санітарії — **88%** (*PFC 5*)
- ❖ На **2/3** скоротиться захворюваність на діарею за умов покращеної санітарії та гігієни (*PFC5*)

- ❖ Відсоток від загальної дитячої смертності до 5 років через діарейні захворювання — **17% або 1,8 мільйонів дітей, не враховуючи неонатальну діарею** (*World Health Report 2005, CHERG*)
- ❖ Діарея, як причина дитячої смертності, **посідає друге місце після пневмонії** (*World Health Report 2005, CHERG*)
- ❖ Щорічна кількість випадків діареї, що буде попереджена за умов досягнення ЦРТ з санітарії (у порівнянні з рівнем 2000 року) — **390 мільйонів** (*Hutton and Haller, WHO 2004*)
- ❖ Відсоток, на який можна скоротити кількість випадків діарейних захворювань за умов миття рук з милом — **47%** (*Curtis V. And S. Cairncross, Lancet 2003*)